

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷十五

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

聽校官降調編修臣倉聖脈

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣李玠

欽定四庫全書

世醫得效方卷十五

元 危亦林 撰

產科兼婦人雜病科

通治

四物湯

隨證加味宜酌量入

當歸

川芎

熟地黄

洗焙酒炒

白芍藥

各等分

右剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前熱

服為未服亦可若平常血氣不調及常服只用本方
春加當歸夏加芍藥秋加川芎冬加地黃各一兩半
日二三服 妊婦作惡生寒面青不思飲食憔悴陳
皮枳殼白朮茯苓甘草 產后敗血築心地骨皮芍
藥 潮熱黃芩地骨皮柴胡 咳嗽桑白皮半夏生
薑人參甘草北五味子地骨皮 損孕下血不止頭
痛寒熱耳鳴氣血勞傷所致黃芩荊芥生地黃生薑
赤芍藥 虛寒潮熱柴胡地骨皮白朮茯苓甘草秦

芡知母黃芩麥芽貝母人參烏梅棗子 心腹脹滿
枳殼青皮 虛汗麻黃根 產後潮熱北柴胡白朮
甘草牡丹皮地骨皮有熱黃芩汗加浮麥 腸風下
血槐角槐花枳殼荊芥黃芩大腹皮紅內消地榆石
楠皮白雞冠花為散煎一半為末空心鹽湯舊酒調
下 鼻衄吐紅竹青蒲黃藕節半夏丁香訶子桂花
紅棗飛羅麩白茅根蚌粉 妳癰連翹茨菰子紅內
消白芷菰片荊芥牛膝山蜈蚣乳香沒藥漏蘆生地

黃 血風兩脇築疼或盤腸成塊大黃華撥乳香

胎動漏下不止黃耆側柏阿膠甘草續斷平常經血
淋瀝不斷或多或少或赤或白非時漏下可多服有

效 月水不通野苧根牛膝紅花蘇木舊酒水同煎
臨產小腹緊痛紅花滑石甘草燈心葵子 閉經枳

殼大黃荊芥黃芩青皮滑石木通瞿麥海金沙山梔
子車前子 安胎及胎漏下血阿膠大艾甘草蒲黃

炒過 產後腹痛血塊攻腸大艾沒藥好酒 產後

病眼北細辛荊芥菴活甘草菊花木賊石決明草決
明 女人赤眼頭風疾薄荷清茶 赤眼生風防風
黃芩 產後浮腫氣急腹大喉中水雞聲牡丹皮荊
芥白朮桑白皮赤小豆大腹皮杏仁半夏馬兜鈴生
薑蔥白薄荷 月水不調血崩或多少或前後嘔逆
心膨陳艾黃耆 血弱生風四肢痺疼行步艱難乳
香人參沒藥麝香甘草五靈脂菴活獨活防風荊芥
地龍南星白附子澤蘭為末蜜圓木瓜鹽湯下 血

氣膨脹甘草木香枳殼馬兜鈴葶藶紫蘇藿香地黃
空心服 補血住崩百草霜敗棕灰月綿灰蒲黃炒
過龍骨白薑 血成片地黃藕節 黑血片人參白
朮 白血片龍骨 青黃木瓜 五色生麝香好酒
鮮紅溫酒鹽湯 風瘡赤腫荊芥牛蒡子何首烏甘
草防風羌活地黃鹽酒 帶下肉桂蒲黃百草霜甘
草黑苳白朮玄胡索白薑龍骨空心鹽酒 血寒甘
草烏梅柴胡桃柳枝 感風勞嗽欵花知母阿膠半

夏麻黃甘草馬兜鈴黃芩杏仁柴胡姜錢訶子烏梅
月經久閉肉桂甘草黃耆姜錢棗子木通紅花 大
便下血四肢寒膨脹乃腸胃有風槐花枳殼漏蘆荆
芥木香白雞冠花木通紅內消紫草石榴皮陳皮黃
芩青皮甘草白茅根槐角 虛瀉人參川芎白芷蒲
黃炒阿膠白朮萊菔續斷乾薑黑附子肉桂黃耆赤
石脂甘草蜜九鹽梅湯下 白帶用龍骨酒 胎前
產後痢後風乳香龍骨萊菔木香肉桂蒼朮牡丹皮

白薇人參甘草澤蘭大椒茴香煉蜜為圓木瓜酒下
亦治帶下 赤白痢陳米飲 心腹膨炒薑酒 血
氣艾醋湯 渾泉勞倦為末炒薑酒陳青蒿鹽和調
下 虛證四肢黃甘草牡丹皮澤蘭白薇蒼朮桂心
茴香蜜丸鹽湯溫酒下 嘔逆飲食不入加白朮丁
香甘草人參縮砂益智仁胡椒 經行腹痛腰背痛
雲臺牛膝紅花吳茱萸菴藷甘草銀器燈心熱服
虛渴人參乾葛烏梅瓜蒌根 受胎小腸氣痛木香

銀器 胎前嗽枳殼甘草欬花知母馬兜鈴半夏木

通葶藶人參苦梗麥門冬 腳腫大腹皮赤小豆茯苓

苓皮生薑皮 產後不語失音訶子人參砂蜜百藥

煎 陰陽交合經脉行赤石脂黃耆肉桂百草霜敗

棕灰肉苳蔻當歸木香龍骨白朮茯苓地榆藕節

胎氣衝肝腰脚痺行步艱難枳殼甘草木通連 荊

芥地黃羌活獨活山梔子燈心空心服 氣築小腹

痛玄胡索煎效 常服加茱萸陽臟少使陰臟多用

莪朮湯

隨證加味宜酌量入

當歸

去尾

川芎

莪朮

煨

甘草

楊芍藥

熟地黄

酒蒸洗

茴香

白芷

右為末每服二錢鹽酒調下 月經不調銀器燈心

安胎黃耆生地黃 補虛調氣生薑紅棗 遍身虛

腫當歸 小便不通滑石末 心虛發狂朱砂研調

敗血衝心腹痛如刀刺燒秤錘紅焮酒不退五靈脂

酒 血閉身疼炒薑酒 吐酸水丁香七粒煎湯

血風上攻眼目浮腫荊芥 小腹痛木瓜 渾身浮

腫薑湯或蔥湯 胃惡藿香 頭面腫赤荊芥湯

下血不止木香湯 冷嗽桑白皮乾柿 頭痛川芎

細辛 血風熱潮生薑紅棗 虛汗麻黃根吐不止

陳青蒿 血風腰疼雲臺子搥碎 女人血結不通

手發掣急不知苦薺菜一握順流水柳汁 手足痺

樟柳根浸酒 血海虛冷大艾 腹脹不消芝麻一

合炒薑酒 月水不勻當歸浸酒 女人血氣成塊

築心銀子燈心

血崩赤白帶真龍骨末好紅酒調

血風中心狂言亂語渾身壯熱桃柳枝七寸

血刺

成塊不散菴藺

女人癖氣膈氣炒茴香酒

婦人

不問虛熱傷風血氣潮熱憎寒一切百病先以參服

隨證湯引投之服以他藥調理無不應驗 冷嗽猪

血 心燥猪肝酒

催生順流子滑石禹餘糧榆白

皮坯子乳香葵子酸車草汁煎湯

黃柞葉垂下者

胎衣不下再加莪朮地黃竹青

行血菴藺生地黃

紅花蘓木陳艾減揚芍藥加赤芍藥梢

加味五積散

厚朴

去麁皮
薑汁炒

半夏

洗

楊芍藥

枳殼

去穢
炒

木香

肉桂

各一兩

陳皮

白薑

一兩
三錢

蒼朮

六兩米
泔浸炒

桔梗

香附子

炒去
毛

茴香

炒

粉草

人參

去芦

茯苓

去皮

川芎

當歸

去尾

川白芷

各一兩

右判散生薑木瓜入鹽煎服

陰證傷寒生薑附子

血脉不勻紫蘇

氣嗽烏梅姜錢

勻經棗子姜錢

補益血海蘇鹽

產後生薑醋炒陳艾

胃冷不納

食陳皮縮砂

赤白帶陳米

冷氣疾木香茱萸

心燥背筋急頭暈腰脚痠生乾地黃當歸

脾虛蘇

葉粉草

月中被驚或因爭觸心頭結塊五膈五噎

茴香棗子

口苦舌乾吞酸噫氣此為胃冷生薑鹽

腰痛桃仁木瓜杜仲川續斷

身疼秦艽 諸虛脾

胃不和羸瘦冷氣蘇鹽

冷瀉炒過生薑烏梅肉豈

寇陳米

芎歸湯治產前產後腹痛體熱脅疼及諸疾纔差了未進藥即先服此能除諸疾逐敗血生新血

川芎

二兩

川當歸

三兩

右剉散每服三錢水一盞酒二分煎溫服為末亦可將產先安排兩服煎產了速進之三日內日二服三日外日一服諸證失血傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血拔牙去血不止及一切去血過多心

煩眩暈悶絕不省人事頭重目暗舉頭欲倒悉治若
產後眩暈宜加楊芍藥 產後腹疼不可忍者加桂
心酒與童子小便合煎立效 臨月服之則縮胎易
產兼治產後諸疾 虛損羸乏腹中疝痛往來寒熱
吸吸少氣不能支持頭眩自汗腹內拘急每服用精
猪肉一兩薑十片水二盞煎溫服 婦人室女心腹
疝痛經脉不勻水煎 妊婦胎氣不安產後諸疾酒
煎 婦人血氣上喘下腫等分為末二錢空心煎艾

湯 產後及損娠敗血衝 腹脹氣絕者神效

難生倒橫子死腹中先用黑荳一大合炒熟水一盞
入童子小便一盞藥四錢煎至一盞以上分為二服
未效再作 產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用
黑荳加生薑自然汁半合煎服 兼治臟毒每服一
錢半入炒槐花半錢水一盞煎不以時服三日取下

血塊即愈 產後頭痛荊芥 吐血亦宜服

通真丸

隨證加減

當歸

去尾

蒼朮

切炒

肉桂

防風

川芎

人參

白芍藥

白薇

去土

熟地黃

酒炒

牡丹皮

茴香

白朮

白茯苓

桔梗

附子

炮

澤蘭葉

各等

右為末蜜丸每服一九

血崩經脉不勻赤白帶下

炒當歸酒下

血風癰疹瘙痒或痛薑下

冷氣塊

築心腹嘔逆反胃炒鹽湯下

腸風瀉血赤白痢月

信不止米飲下

血風勞倦青蒿酒

頭疼眼花荊

芥茶下 月信不行室女紅脉不通產後諸風中風

不語迷悶五九紅花蘇木湯 胎漏下血氣刺心腹

脹滿炒薑酒下

白薇散

隨證酌量用湯引

白薇

去土

川芎

熟地黄

酒炒

桂心

牡丹皮

去骨

甘草

當歸

去尾

澤蘭葉

蒼朮

切炒

芍藥

各等分

右為末每服三錢 氣刺心脅痛艾醋澤蘭湯 頭

痛心燥米泔米飲 氣虛土芎湯 頭痛荊芥湯

胎前潮熱氣急心悶生地黃燈心 產後腹膨吐逆

藿香胡椒 胎氣不安陳艾 下血不止糯米地榆

陳艾 產後血刺脇痛艾醋湯 小腹疼地黃薑汁

好酒 產後腰腿疼背膊痛木瓜白膠香沒藥好酒

月經不勻百草霜溫酒若過多藕節酒煎又用陳艾

阿膠月水不通杜牛膝野苧根蘇木紅花酒下 膏

腰痛沒藥 白帶黃耆切和鹽炒酒浸喫十服 胎

衣不下順流水酸車草 產後血氣當歸鹽炒好酒

產後勞嗽糯米桑白皮 熱嗽生地黃芭蕉水 產

前產後浪熱桃柳枝 臨產小腹緊痛桑白皮葛根

立便追生 產前產後臟腑結枳殼 下血地榆

心神亂銀器 大小便秘麻仁蘇子 血風脚膝腫

痛寒熱生薑黃水柳根 血崩竹青藕節霜梅 熱

吐紅山梔子竹青藕節 妳癰蔓荊子酒煎調

大烏鷄圓治胎前產後諸般疾患並皆治之

烏雄雞

烏藥

五錢

海桐皮

一兩

草果

二錢半

石牀

五錢

肉桂

去麝皮
一兩

熟乾地黄

洗焙
三錢半

人參

白朮

各半兩

附子

去皮臍
一兩

木香

二錢半

黃耆

牡丹皮

各半兩

白芍藥

蓬莪朮

川烏

炮

陳皮

紅花

各一兩

玄胡索

肉苳蔻

各二錢半

蒼朮

米泔浸切
七錢半

琥珀

二錢半

右剉散用烏雄雞一隻湯搗去毛及腸肚將藥安置肚中用新甕瓶好酒一斗同煮令乾去雞骨以油單盛

焙乾為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九 胎前產

後傷寒蜜糖酒服 胎前氣悶壯熱炒薑酒 赤白

帶下生薑地黃煮酒 產後敗血攻心童子小便炒

薑酒 產後血塊築痛玄胡索酒 胎前嘔逆薑湯

催生炒蜀葵子研入酒 安胎鹽酒 室女紅脉當

通不通四肢疼痛煎紅花研入酒 血氣攻刺心腹

疼痛煎當歸酒 血暈棕櫚燒灰入酒 血邪研朱

砂麝香入酒 血悶煎烏梅湯入朱砂末 子宮久

冷溫酒或棗湯空腹日一服 血風勞人參酒 小
便疔痛炒茴香食鹽入酒 血散四肢遍身虛浮黃
腫赤小豈研細入酒 常服溫酒醋湯並空心吞服
大效活血圓治產後虛羸及傷血過多虛竭少氣臍腹
拘急痛引腰面白脫色嗜卧不眠唇口乾燥心忪煩
倦手足寒熱頭重目眩不思飲食或勞傷衝任內積風
冷崩中漏下淋瀝不斷及月水將行腰腿重疼臍腹急
痛及治男子婦人從高墜下內有瘀血吐血下血等病

真蒲黃

炒

三分半

熟乾地黄

酒炒

阿膠

蛤粉炒成珠

當歸

川續斷

乾薑

甘草

芎藭

附子

白芷

白朮

各三兩

肉桂

去麋皮

白芍藥

各三兩

吳茱萸

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓食前溫酒
下漸加至五十圓一方加杜仲鹿茸肉蓯蓉北五味
子

養榮衛湯治榮衛不調血氣虛弱面色痿黃四肢無力
手足倦怠盜汗併出皮肉枯痺骨肉羸瘦飲食不進日
漸著床病後不能調理變成崩漏用之神效

木香

丁香

丁皮

巴戟

去心

紫蘇葉

白茯苓

蒼朮

肉苳蔻

附子

沉香

苦梗

粉草

茴香

山藥

白苳蔻

偏苳

右判散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗煎溫服

止瀉加黑豈炒 止痢加栗殼蜜炒

神應圓治月水過期不通久無嗣息血癖氣痛四肢浮腫嘔逆心疼虛煩鬱悶面色痿黃崩漏帶下寒熱蒸勞頭疼齒痛血下無度淋瀝諸疾產前安胎臨產催生產後胎結疼痛傷寒煩渴瀉痢血暈血勞筋攣痰盛頭疼敗血上衝血刺泄瀉咳嗽喘急咯血血塊起伏氣痞氣膈血滯腰痛小便不禁子死腹中傷寒汗不出血風腳手痺頑凡產後諸疾並皆治之

牡丹皮

去骨

川藁本

人參

去蘆

川當歸

去尾

白茯苓

赤石脂

香白芷

交趾桂

去麋皮

白薇

去土

川芎

玄胡索

白芍藥

白朮

米泔浸一宿各一兩

甘草

炙

沉香

不見火

右件並用溫水洗淨藥乾槌羅為末煉蜜丸如彈子大
每服一九空心溫酒下凡妊娠臨月服此五六丸即
易產如久無子息服二十九當月有子并治積年血
風光身不遂種種血疾不問年深日久皆療神效

大聖散治血海虛冷久無子息及產後敗血衝心中風
口禁子死腹中擘開口灌藥須臾生下無恙并治墮胎
腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣不下血暈血癖血滯血
崩血入四肢一應血臟有患及諸種風氣或傷寒吐逆
咳嗽寒熱麻木遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白帶
下乳生惡瘡胎產虛冷數曾墮胎崩中不定因茲成疾
及室女經脉不通並宜服之常服暖子宮和血氣悅顏
色退風冷消除萬病丈夫五勞七傷虛損一切疾證亦

治之

澤蘭葉

石膏

研各二兩

白茯苓

去皮

卷栢

去根

栢子仁

炒

防風

去蘆

厚朴

去麁皮
薑汁炙

細辛

去苗

人參

去苗

藁本

去苗

乾薑

炮

五味子

白芷

川椒

去目及閉口者
炒出汁

白朮

各三分

當歸

去芦

蕪荑

炒

甘草

炙

川芎

各一兩三分

生乾地黄

一兩半

官桂

去皮一兩一分

黃耆

去苗三分

芍藥

一兩三分

白薇

半兩

桔梗

一兩

川烏

三分

阿膠

半兩

丹參

三分

吳茱萸

湯洗七次
焙炒

右為末每服二錢空心熱酒調服若急有患不拘時

候日三服

大玄胡索散治經病及產後腹痛脹滿喘悶癥瘕癖塊
一切心腹暴痛

甘草

一兩

桔梗

黃芩

大黃

各半兩

當歸

去尾

三棱

莪朮

煨

官桂

去麝皮

玄胡索

赤芍藥

厚朴

木香

檳榔

川練子 各二錢半

右剉散每服三錢水一盞煎熱服食前日三服惡物過多去大黃官桂加入黃藥子槐子龍骨各半兩或平人心脾急痛服得利亦效後常服亦可

專治睡後忽一點疼起遂致遍身亦痛諸藥不效用艾炷如小指頭大以水透濕紙約五六重纏裹其手痛止又用斷木匙頭安放濕紙上對抵痛處却將艾炷於木匙上灸其發艾之人默念 大慈大悲救苦

救難觀世音菩薩摩訶薩名號三七遍須臾諸痛悉
除所灸處亦有膿水出生痂癩而後愈

感冒

麻黃湯發散四時傷寒潮熱頭痛時疫

前胡

柴胡

各去毛

石膏

蒼朮

剉炒

藁本

赤芍藥

白芷

土芎

乾葛

升麻

各五錢

麻黃

三錢

右剉散每服四錢生薑三片連鬚蔥三根煎不拘時

服 春加黃芩 夏用正方 秋加麻黃 冬加豉

解肌湯治勞傷體熱鼻血兼退熱

柴胡 麻黃 木通 茯苓

犀角 蒲黃 黃芩 赤芍藥

葛粉 生地黃 甘草

各等分

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎
不以時溫服

人參湯治經水適斷熱入血室寒熱如瘧日晡最甚加

生乾地黃每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎

溫服不拘時候

方見大方科傷寒類即小柴胡湯

桂枝紅花湯治傷寒發熱惡寒四時拘急口燥舌乾經水凝滯不得往來

桂枝

赤芍藥

甘草

各一兩半

紅花

一兩

右剉散每服五錢水一盞半生薑四片紅棗二枚煎溫服良久汗出而解

海蛤散治傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近

海蛤

滑石

甘草

各二兩

芒硝

一兩

右為末每服二錢雞子清調下小腸通利則胃膈血散臍中血聚則小腸壅既壅則臍中血不流行宜服此若小便利血數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈三黃丸治陽毒傷寒棄衣而走不避親疎妄言罵詈以朱砂為衣新汲水下十丸即效未效再服

方見大方科積熱類

喘嗽

人參散治血風勞嗽乍寒乍熱傷寒咳嗽起坐不能

人參

知母

秦艽

款冬花

麻黃

杏仁

苦梗

馬兜鈴

寒水石

南星

地骨皮

粉草

半夏

各等分

右判散每服三錢水一盞半麥門冬二十粒去心煎溫服喘嗽加烏梅氣急桑白皮

噲化丸治患肺熱久嗽身如炙臍將成肺勞

枇杷葉

去毛

桑白皮

款冬花

木通

紫苑

杏仁

各等分

大黃

減半

右為末煉蜜丸如櫻桃大食後夜卧食化一九

貝母湯治諸嗽久不差

貝母

生薑汁浸半日

北五味子

黃芩

乾薑

熱者減半

陳皮

各一兩

半夏

桑白皮

桂心

北柴胡

各半兩熱甚者減一半

木香

甘草

各一分

右剉散每服五錢水一盞半杏仁七粒去皮尖碎之

生薑二片煎熱服

金不換散治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿悶
咳嗽涎盛腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽咳唾紅痰
及遠年日近一切喘嗽諸藥不效者並治之

罌粟殼

半兩去膜
蜜炒乾

枳殼

四錢

杏仁

去皮
尖

甘草

各三錢

右判散每服三錢水一盞生薑三片烏梅半個煎食
後臨卧漸漸熱服

千絳湯治痰喘數服瘥

齊州半夏

七枚炮裂
四片破之

皂角

去皮炙
一寸

甘草

炙
一寸

生薑

如指頭大

右以水一碗煮去半頓服

調經

煮附圓治婦人室女一切血氣經候不調臍腹痛面
色痿黃心忪乏力腹脹脇疼頭暈惡心飲食減少崩漏
帶下大腸便血積聚癥瘕並皆治療若以其名人人言
之耗氣不喜此藥世訛之久不肯服者甚多殊不知獲

效非常古方所載婦人仙藥不可輕忽修製相感豈同日而語哉服之自顯其功耳

右以香附子不拘多少先搗去毛淨用好醋煮半日出焙碾為末醋糊圓梧桐子大每服三四十圓米飲吞下不以時候婦人數墮胎由氣不下降所以胎氣不固此藥尤妙一方加陳艾亦有加當歸鹿茸

滋血湯治血熱氣虛經候滯不通致使血聚肢體麻木肌熱生瘡渾身疼痛將成勞瘵不可妄投他藥但宜

以此滋養通經

馬鞭草

荊芥穗

牡丹皮

去骨

赤芍藥

枳殼

去穰炒

肉桂

當歸

去尾

川芎

各等分

右剉散每服四錢水二盞烏梅一個煎至一盞空心
日四五服有此證服至半月或一月經脉自通百病
皆除

涼血飲治血熱經水不調心煩口乾煩燥或遍體生瘡

赤芍藥

黃芩

川芎

甘草

荊芥

生乾地黄

去土

麥門冬

去心

瓜根

右剉散每服三錢水一盞半燈心十莖淡竹葉十張煎溫服不拘時有寒熱加秦艽北柴胡此濟陰為第一方

紫石英圓治月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫者一例呼為經病不曾說得陰勝陽陽勝陰服藥所以少效蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水不成流故令乍少在月後若陽乘陰則血流散溢

所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多兩在月前當知其陰陽調其血氣使不相乘以平為福

紫石英

細研水飛

人參

龍骨

川烏頭

炮

桂心

禹餘糧

煨醋

杜仲

炒去絲

遠志

去心

澤瀉

當歸

桑寄生

菰蓉

酒浸

乾薑

炮

五味子

石斛

去各一兩

牡蠣

煨

甘草

炙

川椒

去目及閉口炒出汗各半兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十至五十圓空心

米飲下

當歸散治天癸已過期經脉不勻或三四月不行或一月再至腰腹痛素問云七損七益謂女子七七數盡而經脉不應時者血有餘也不可止之但令得應時不腰痛為善

白朮

半兩

黃芩

山茱萸

湯泡取肉

當歸

川芎

楊芍藥

六味一同研細各一兩病證若冷去黃芩加桂

右為末每二錢酒調空心日三服養胎益血安和子臟

通經圓治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕

桂心

青皮

去白

大黃

炮

乾薑

炮

川椒

炒出

蓬蘽

炮

乾漆

炒去煙

川烏

炮

當歸

去蘆

桃仁

炒各等分

右為末取四分用米醋熬成膏和餘六分未成劑白
中治之圓如梧桐子大略曬乾每服二十圓至三十
圓用醋湯溫酒空心下尋常血氣凝滯疼痛數服立
效

鹿茸附子圓補氣固血治木臟因虛生寒月經行多或少或及期腹痛怯風臟腑不和

鹿茸

五味子

茯苓

杜仲

赤石脂

各兩

吳茱萸

附子

炮

乾薑

黑龍骨

肉苁蓉

白茯苓

各半兩

乾地黄

一兩半

右為末酒煮麴糊為丸梧桐子大空心食前熱米飲下五七十九一月血氣已安去龍骨加沉香半兩可以常服中年以後婦人最宜服此

三稜丸治紅脉不通氣痛滯下兼治血瘕形如鑊鐵樣

當歸

去尾

川芎

牛膝

去苗

芫花

三稜

莪朮

煨

蒲黃

玄胡索

牡丹皮

乾薑

菴藺

白芷

地龍

去泥土酒浸炒各一兩

大黃

二兩為末米醋一升文武火熬成膏

右為末入大黃膏和研杵爛為丸每服二十九氣痛
淡醋湯下炒薑酒亦可未通紅花酒下

治經脉不利方緣經滯即為水水流走四肢悉皆腫滿

名曰血分其候與水相類醫作水治之非也宜此

人參

當歸

大黃

濕紙裹三斗米下
蒸米熟去紙切培

桂心

瞿麥穗

赤芍藥

白茯苓

各半兩

葶藶

炒別研一分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十五丸至二十丸
空心米飲送下

獨勝方治月信退出皆為禽獸之狀似來傷人先將綿
塞陰戶只須服

右以沒藥一兩作丸散皆可服即愈

調氣阿魏丸大聖散兼服治經行腹痛不可忍者立效

紅丸子亦效

阿魏丸大方科心痛類 大聖散方見前紅丸子大方

艾煎丸治婦人室女經候不調臍腹冷痛惡心腹常脹

滿至晚則增

食茱萸

湯洗

當歸

各七錢半

熟地黄

白芍藥

石菖蒲

炒

川芎

人參

各一兩

熟艾

四兩糯米飲調

作餅
焙

右為末煮酒糊丸梧桐子大調縮砂香附湯送下五

十丸

方見大方科諸氣類

濟陰丹治經水不時或崩中漏下一切血疾

方見前

杜牛膝散治婦人室女血閉不通五心煩熱

紅花

二錢半

大當歸

杜牛膝

各五錢

桃仁

去皮尖炒研二

半錢

右為末每服二錢空心溫酒下

大油煎散治經候不調臍腹脹腰腿無力煩渴潮熱身

體拘倦日漸羸瘦

海桐皮

五加皮

牡丹皮

地骨皮

桑白皮

各等分

右剉散每服四錢生薑三片紅棗一枚清油數點水
一盞半同煎空心溫服

血氣

抽刀散治血風血氣等疾

五靈脂

炒

一兩 莪朮

桂心

雲臺子

炒各半兩

右為末每服二大錢酒半盞煎八分疾作熱服

二神圓治血氣不和作痛不止及下血無時月水不調

真蒲黃

炒

萆撥

鹽炒

右等分為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓空心溫酒送下不飲米飲下一二服即止

沒藥散治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不行兒枕塊痛

血竭

沒藥

火煨
細研

桂心

當歸

去尾

蒲黃

紅花

木香

延胡索

乾漆

炒

赤芍藥

各等分

右為末每服二錢食前熱酒調下

玄胡索湯治婦人室女七情傷感遂使血與氣併心腹作痛或連腰脇或引背脊上下攻刺甚作搐搦經候不勻但是一切血氣疼痛並可服之

當歸

去蘆酒浸剉炒

玄胡索

炒去毛

蒲黃

炒

赤芍藥

官桂

不見火各半兩

片子薑黃

洗

乳香

沒藥

木香

不見火
各三錢

甘草

炙
二錢半

右判散每服四錢水一盞半生薑七片煎食前溫服
吐逆加半夏橘紅各半兩

寄奴圓治婦人室女月水凝滯脇肋脹刺臍腹疔痛不
可忍及惡露不下血上攻心迷悶不省應有血氣腹痛

並

牡丹皮

去木

赤芍藥

蓬莪朮

判

荆三稜

判用

劉寄奴

去梗

熟地黃

酒炒

玄胡索

炒

當歸

酒浸

烏藥

官桂

不見火
各一兩

右用前五味以烏莖一升生薑半斤切片米醋四升
同煮莖爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢溫
酒調空心食前服

最神圓治室女血氣相搏腹中刺痛痛引心端經行澁
少或經事不調以致疼痛

橘紅

二兩

玄胡索

去皮
醋

當歸

去蘆酒浸剉
畧炒各一兩

右為末酒煮米糊為圓梧桐子大每服七十圓加至

一百圓空心艾湯或米飲送下

失笑散治血氣心腹刺痛欲死諸藥不效服此頓愈

五靈脂

蒲黃

微炒各等分

右為末先用二錢醋調熬成膏入水一盞煎七分食前熱服

奇方治血氣痛遊走及腰痛

右用莪朮切片乾漆打碎各二兩同炒令漆焦香取出漆不用只以莪朮為末溫酒調下三錢腰痛胡桃

酒下遊走痛冷水調下

手拈散治血氣刺痛不可忍者及諸般氣痛

方見前大方息痛類

二神圓治血氣絞刺痛

方見前

大效煎圓治血氣痞滿刺痛大效

方見大方科諸氣類

血瘕

桃仁煎治血瘕血積經候不通

桃仁

大黃

各一兩

蠅虫

半兩炒黑

川朴硝

一兩

右並為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一升

五合下大黃桃仁等不住手攪欲下手圓下朴硝更
不住手攪良久出之圓如梧子大前一日不喫晚食
五更初用溫酒吞下五圓取下如赤豈汁或如雞肝
蝦蟆水狀未下再作如鮮血來即止續以調血氣藥
補之虛人酌用

琥珀圓治血瘀腹中有塊攻刺小腹痛重或腰背相引
為痛久而不治黃瘦羸乏

琥珀

另研

白芍藥

川烏

炮去皮

川牛膝

去蘆酒浸

鱉甲

蓬莖蘼

炮

當歸

去蘆酒浸

梓厚朴

薑炒各一兩

木香

不見火

澤蘭葉

官桂

不見火各半兩

麝香

另五分

右為末酒糊圓梧桐子大每服七十圓空心溫酒米飲

下

通經圓治室女月經不行臍下堅結大如杯升發熱往來此名血瘕加紅花

方見前

黑神圓

神麴

茴香

各四兩

木香

川椒

炒出汗

丁香

各半兩

檳榔

四枚

漆

六兩半生半重湯煮半兩

右除椒漆餘五味皆半生半炒為末用生熟漆和圓如彈子大茴香末十二兩鋪陰地陰乾候外乾并茴香收器中極乾去茴香 膀胱瘕癖及疝墜五膈血崩產後血虛或下赤白並一圓分四服 死胎一圓舊綿灰酒下 難產炒葵子四十九粒搗碎酒煎下一圓 諸疫不過三服瘕氣十服膈氣癥癖五服血瘕三圓當差

血蠱

木香散治脾氣血氣血蠱氣蠱水蠱石蠱

木香

沉香

乳香

炮

甘草

炙 各一分

川芎

胡椒

陳皮

人參

晉礬

各半兩

桂心

乾薑

炮

縮砂

各一兩

茴香

大茄

五兩赤小者乾秤

右洗焙為末每服二錢空心陳米飲調下忌羊肉

茱萸圓治婦人諸疾繼續而生帶下淋瀝五邪失心愁

憂思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹中一切疾病有以懷孕連年累月羸瘦困弊或歌或哭如鬼所使但服此藥無不愈者

吳茱萸

湯洗七次
焙炒半兩

桔梗

半兩

柴胡

菖蒲

紫苑

去苗
葉土

黃連

去鬚

肉桂

去麋皮

茯苓

蜀椒

去目及閉口
者炒出汗

人參

去蘆

厚朴

去麋皮
薑汁炒

巴豆

去皮心膜
出油炒研

皂莢

去皮子
各半兩

川烏

炮去皮臍二兩半

右為末入巴豆和勻煉蜜圓梧桐子大每服二圓生薑湯下食後臨卧漸加至五七圓

血癖

紅圓子治經水不調腹中癖聚成塊流走作痛肌膚消瘦腹滿不敢食用烏梅濃煎湯入鹽少許服之薑湯下亦可

方見大方科痰瘕類

大麝香圓治瘰癧冷氣兼症氣心腹痛不可忍

麝香

半兩
另研

阿魏

一分麝裏煨
麝熱取出

五靈脂

桃仁

去皮尖

三稜

各三分

芫花

醋炒

檳榔

各一兩

莪朮

煨

桂心

沒藥

另研

木香

當歸

各半兩

右為末入麝香令勻用粳米軟飯為丸梧桐子大每服十丸不以時淡薑湯下

神效方治瘰癧及血氣

右以獾猪肝一具可及十兩者用巴豆五十粒去大皮剉入肝內用醢醋三盞慢火熬令肝爛熟去巴豆

入砂鉢內研極爛入荊三稜末和就得所丸如梧桐子大每服五丸食前熱酒下

小烏鷄煎丸治疔瘰癧瘰癧血氣塊硬發歇刺痛甚則欲死或塊如小盤每作痛要人伏定方少止數年不愈者與

蔥白散間服即效

吳茱萸

良薑

白薑

當歸

去頭

赤芍藥

延胡索

破故紙

川椒

生乾地黄

劉寄奴

蓬莪朮

橘紅

青皮

川芎

各一兩

荷葉灰

四兩

熟艾

二兩

右為末醋煮麪糊丸梧桐子大每服三五十丸熱酒下
川芎散治產前後腹痛胎不安或血刺痛百兼治血臟
宿冷百節倦疼肌體怯弱勞傷帶癖久服盡除婦人一
切疾病最宜服之

川芎

當歸

去尾

枳殼

厚朴

去麤皮
薑汁炒

桂心

乾薑

芍藥

舶上茴香

青皮

苦楝子

木香

熟地黃

酒炒

麥芽

三稜

莪朮

煨

茯苓

去皮

神麴

人參

各等分

右為末每服三錢連根蔥白二寸擘破鹽半錢煎服
如大便不利入大黃煎却不入鹽若大便自利入訶
子煎

腸軍

烏喙丸治腸軍病因寒氣客於腸外與胃氣相搏正氣

不勝繫痼內著惡氣乃起其生也始如鷄卵久久乃成
狀如懷胎按之堅推之即移月事時下故曰腸覃亦治
乳餘疾大小便不利并食有伏蠱臚服癰疽毒腫久寒
邪氣

烏喙

炮去皮
尖二錢

半夏

湯洗
四錢

石膏

炮

藜蘆

炒

牡蒙

即紫參

從蓉

酒浸
各一錢

乾薑

炮

桂心

各一錢
三字

巴豆

六七粒
研膏

右為末煉蜜圓菜菔大每服三五丸食後酒或飲送下

亦治男子疝痛

食積

三稜煎治血癥血瘕食積痰滯

三稜

煨

莪朮

煨

各二兩

青橘皮

去白

半夏

麥芽

炒各一兩

右以好醋六升煮乾焙為末醋糊圓梧桐子大每服
三四十圓淡醋湯下痰積多以薑湯送下

紅圓子治食積作塊膨痛面黃

方見大方
科痰瘕類

膈氣五膈寬中散分心氣飲沉香降氣湯

方並見大方
科諸氣類

血風

人參荊芥散治血風勞氣身體疼痛頭昏目澁心忪煩
倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽或月水不
調臍腹疔痛瘰癧塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食不進
或因產將理失節淹延瘦瘁乍起乍卧甚即著牀常服
除一切風虛勞冷孕婦莫服

荊芥穗

人參

桂心

生乾地黃

北柴胡

去苗

鱉甲

醋炙

酸棗仁

炒

枳殼

去穰

羚羊角屑

另為末

白朮

各七錢半

川芎

當歸

防風

甘草

各半兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片煎熱服日二服
單方治血風攻頭腦旋倒地不知人事

右以嫩蒼耳草心不拘多少陰乾為末不以時服一
錢效

小黑神圓治血風走注攻刺半身不遂麻痺瘙痒急風

口眼喎斜言語蹇澁手足拘攣

烏頭

一個

羌花

乾薑

各五錢

右為末醋煮令乾更杵為末再入桂心

二錢

天麻

一錢

海

桐皮

一錢

黑荳為末入前藥和勻別用黑荳煮極爛研

如泥以荳汁調和前末研合為圓每服七圓至十圓
以黑荳淋酒下忌一切毒物

大芎藭散治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思
飲食

川芎一兩

赤茯苓

赤芍藥

酸棗仁炒

桂心

當歸去尾

木香

川牛膝各三分

羌活

枳殼去穰
麩炒

甘草各半兩

右剉散每服三錢水一大盞薑三片煎不拘時熱服

羚羊角散治血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角屑

酸棗仁炒

生乾地黄

檳榔各一兩

五加皮

防風去叉

赤芍藥

當歸

骨碎補炒
去毛

海桐皮

川芎各三分
甘草半兩

右為末每服二錢溫酒調下

歷節風

麝香圓治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲嚙晝
靜夜劇及一切手足不測痛

大八角川烏頭

二十三個去一粒皮臍生

生全蝎

二十一個

生黑荳

生地龍

去土淨半兩

右為末入麝香一字同研停勻糯米糊圓菴荳大每服
七圓甚者十圓夜卧令膈空溫酒吞下微出冷汗便瘥

血虛

大補血虛湯治頭痛發熱多汗六脉虛細尺脉或絕作
血虛治之服後藥見效

朮附湯加川芎先服

方見大方
科中濕類

十全大補湯加附子

次服

大方科
虛損類

又服萬安圓

大方科
虛損類

神朮散

大方科
傷寒類

內

補圓

芎歸湯

方見
前

靈砂丹有婦人頭痛惡風發熱六脉沉取無根浮取却

有乃是虛證

方見大方
科痼冷類

右用人參一二兩銀鉚煎湯空心下二十粒五更又
下二十粒天明而愈

鹿膠湯治血虛勞倦

鹿角膠

當歸

去尾

黃耆

鹽炙

肉桂

乾地黄

酒炒

石斛

木香

白朮

白茯苓

鱉甲

醋炙

秦艽

川巴戟

柑子皮

各一兩

牡丹皮

天仙藤

甘草

各半兩

人參

二錢

枳殼

三錢

右判散每服水盞半生薑九片薤白三寸煎空心溫服

性香散治脾胃虛弱并脾血久冷

草薺寇

去殼炒用

甘草

高良薑

判炒香

白朮

縮砂仁

各一兩

青皮

去穰炒黃

訶子肉

各半兩

肉桂

一分

生薑

切炒乾

厚朴

去麁皮薑汁炒

棗肉

切三味各一兩水一碗煮令乾同符為圓

乾焙

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點空心服及療腹

痛又治冷瀉尤妙腹痛最難得藥此方只是溫補藥耳特工止痛理不可知

顛狂

加味道遙散治患顛疾歌唱無時踰牆上屋乃榮血迷於心包所致加遠志去心桃仁去皮炙蘇木紅花各一錢水一盞半煎

方見後

服後病退却用平胃散內減厚朴

三分之二加生蒼朮二倍川升麻等蒼朮一半水一盞

半煎一盞服之全安須常服以絕其根

方見大方科脾胃類

小柴胡湯治血熱顛狂加生薑生地黃同煎日三服須服百餘服即安凡婦人顛狂未可頓服補心藥多方見大方

科陽
寒類

煩熱

油煎散治血風勞形憔悴肢節困倦喘滿虛煩噯噯少氣發熱汗多口乾舌澀不思飲食

五加皮

牡丹皮

去骨

赤芍藥

當歸

去蘆各一兩

右剉散每服三錢水一盞將青銅錢一文蘸油入藥

同煎溫服煎時不得攪喫不得吹日三服常服能肥
婦人

逍遙散治血虛勞倦惡心煩熱肢體疼痛頭目昏重心
忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏月
水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又主室女血弱陰虛榮衛
不和癢嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

白茯苓

白朮

去蘆

當歸

去蘆酒浸
半日微炒

白芍藥

北柴胡

去
各一兩

甘草

炙兩半

右剉散每服三錢水盞半薑三片麥門冬二十粒去
心煎不拘時服一方加知母地骨皮

清心蓮子飲治同上

方見大方
科消渴類

春雪膏涼心退煩悶熱極壅盛

寒水石

石膏

滑石

赭石

朴硝 各五錢 甘草 三錢

右為末每服二錢井水調下

朱砂膏治心臟驚熱甚至不省人事

朱砂

鵬砂

礞硝

各二錢半

金銀箔

各五片

寒水石

五錢

腦子

一字

石膏

五錢

粉草

三錢

右為末每服二錢麥門冬二十粒去心煎湯調

敗毒散治但惡寒發熱煩燥緣表中寒邪故也服之立

效

方見大方科傷寒類

黃耆散治熱勞羸瘦四肢煩疼心燥口乾不食

人參

黃芩

黃耆

大當歸

各七錢半

北柴胡

去蘆

麥門冬

去心

地骨皮

赤茯苓

各一兩

生地黃

赤芍藥

甘草 各五錢

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎溫服

心痛

九痛圓治九種心痛一蠱二疰三風四悸五食六飲七冷八熱九種去來此悉主之又治連年積冷流注心胸疼痛并療冷氣衝上落馬墮車瘀血等疾

狼毒 半兩

乾薑

人參 各一兩

附子

茱萸 一兩炒

巴豆

去皮心脫炒
乾取一兩

右為末煉蜜和圓梧桐子大每服一圓空心溫酒下
卒中惡心腹脹痛口不能言者服二圓立安

奇方治血刺心痛

右用玄胡索不以多少新瓦上炒微黃不可焦為末
每服三錢酒一盞煎服或陳米飲不炒亦可用酒服
效速

又治急心痛用南康真蚱粉為末炒赤以酒調熱服

腹痛

北亭圓治久積冷氣腹痛傍攻兩脇或上心間刺痛發

歇無時羸弱減食經年不愈或加嘔吐

方見大方
科虛損類

當歸運中湯亦效

方見大方
科腹痛類

奇方治臍腹刺痛不省人事一服立止若因為心氣痛
誤矣

白芍藥

五靈脂

木通

去皮用
各五

右剉散每服四錢醋一盞煎一二沸再入水一盞再
煎三沸去滓空心溫服

脇痛

木通散治脇肋苦痛

木通

去皮節

青皮

去白

川棟子

去皮用各一兩三錢用巴豆半兩同

炒黃去已
豆不用

蘿蔔子

炒

舶上茴香

炒一兩

莢蔬

木香

滑石

各半兩

右為末煎蔥白酒調三錢一服愈甚者再服

腸氣散治兩脇刺痛攻心

方見大方
科諸氣類

風痺

三痺湯治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾皆治之

川續斷

去蘆

杜仲

去皮切
薑汁炒

防風

桂心

華陰細辛

去葉

人參

白茯苓

白芍

當歸

甘草

各一兩

秦艽

生地

川芎

川獨活

各半兩

川牛膝

黃耆

各一兩

右剉散每服五錢水二盞生薑三片棗子二枚煎一盞不以時熱服但腹稍空服有人病左臂不隨後已瘥平而手指不便無力試諸藥不效服此纔半而安

臂痛

舒經湯治臂痛又名五痺湯亦治腰下疾

片子薑黃

四兩

甘草

羌活

各一兩

白朮

海桐皮

當歸

去尾

赤芍藥

各二兩

右剉散每服三錢水一盞煎溫服如腰以下病空心腰以上食後服

交加散乃五積散敗毒散合和治弱者或兩臂或一臂冷痺作痛起手甚艱每服四錢薑三片棗二枚木瓜

二片水一盞半煎不拘時服未效再加川牛膝

方見大方科傷

寒仍間服通氣驅風湯

方見風科

稱保圓治因食酒毒熱物過度痰飲與氣畜聚所作臂

痛每服二七粒柿蒂湯下得利或不利皆效

方見大方科諸氣類

三痺湯治血滯作臂痛加紅花煎

方見前

搐搦

白薇圓治手足搐搦痰涎壅盛不省人事多因血虛七

情所感而生先將蘇合香圓溫酒化開多服後服此

白薇

紫石英 火煨醋淬七次

琥珀 別研

白芍藥

桂心 不見火 川續斷 酒浸

防風 去蘆

山茱萸 取肉

當歸 去蘆酒浸

栢子仁 炒

川烏 炮去皮

牡丹皮 去木各一兩

木香 不見火半兩

麝香 另研半分

右為末生姜自然汁打米糊圓梧桐子大每服七十圓空心食前溫酒或米飲下

澤蘭圓治女子血實七情所感卒然手足搐搦狀類癇證却不可作癇治之先多以蘇合香圓酒服却投此立

效

當歸

去蘆酒浸

澤蘭葉

琥珀

別研

羚羊角

別銹研

牡丹皮

去木

防風

去蘆各一兩

麝香

別研半錢

安息香

酒煮去砂

生地黄

赤芍藥

各一兩半

鉄粉

橘紅

各半兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服七十圓空心食前溫酒或米飲下

湛濁

二苳散治耳鳴心燥腰脚疼重腹內虛鳴臍下冷痛頻

下白水如泔名泄瀉證

肉苳蔻

白苳蔻

丁香

巴戟

丁皮

白茯苓

蒼朮

桂心

黑附

火煨
各一兩

白朮

人參

山藥

桔梗

茴香

粉草

各五錢

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紫蘇葉三皮

煎空腹溫服

勝金圓治渾身壯熱頭疼臍下疔痛下淡紅水

當歸

去尾

白芍藥

鹿茸

燎去毛
酒炙

鱉甲

川芎

白朮

大艾

炒

側柏葉

赤石脂

醋煨

川白芷

烏賊魚骨

各等分

右為末蜜圓如龍眼大每服一圓空心鹽酒下或敗
棕燒灰調酒吞下

餘糧散治心燥四肢痠疼所下五色腰脚臍中緊痛

禹餘糧

醋煨

地榆

阿膠

赤石脂

紫金皮

茴香

粉草

側柏

各等分

右為末每服二錢米飲調下

烏金散治身熱口燥頭痛如破氣塊築痛下黃水如葵

汁

百草霜

砂內炒煙盡為度

紫金皮

米泔浸煮熟炒焦色

粉草

炙

右為末每服二錢艾湯調或用淡醋湯空心服

又方加入 住紅蘇根金櫻子根 心嘈猪血入鹽炒

酒 吐紅飯飲 勻月水木瓜當歸浸酒 赤白帶

下蔥白連根煎酒 血海虛冷下白不止用鯉魚一

箇去腸肚不去鱗將油髮一塊入魚肚內黃泥固濟炭火內燒煙淡淡留性去泥礪為末後入當歸頭甘草炒為末每服一錢用舊酒調下

白濁

一氣正元丹

方見大方科虛損類

秘精圓

方見大方科淋濁類

四七湯吞青州白圓子

方見大方科喘急類及風科通治類

崩漏

鎮宮圓治崩漏不止或五色或赤白不定或如荳汁或

狀若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈眼花久久不止令
人黃瘦口乾胸煩不食

代赭石

火煨醋
淬七次

紫石英

製同上

禹餘糧

製同上

香附子

去毛醋煮
各二兩

陽起石

煨紅
細研

芎藭

鹿茸

燎去毛
醋蒸焙

茯神

去木

阿膠

蛤粉炒

當歸

去蘆
酒浸

蒲黃

炒
各一兩
血竭
別研
半兩

右為末艾醋汁打糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空

心米飲下

川續斷湯治憂思過度勞傷心經心主血心虛不能維持諸經之血亦能致崩中下血之患

當歸

去蘆酒浸

芍藥

茯神

去木

小草

阿膠

蛤粉炒

鹿茸

燎去毛酒蒸焙

栢子仁

炒各一兩

香附子

二兩

甘草

炙半兩

川續斷

酒浸一兩半

右判散每服四錢水盞半生薑五片煎空心食前溫服

秘方龍骨圓治半產後及下虛數月崩漏不止

白牡蠣

北赤石脂

大赭石

已上並煨

白龍骨

伏龍肝

海螵蛸

五靈脂

側柏葉

各等分

棕櫚

不拘多少燒灰

真蒲黃

多加入

右為末醋糊圓如梧桐子大每服三十五圓以十全

大補湯三錢加嫩鹿茸去毛酒炙阿膠蚌粉炒各一

錢半薑三片棗二枚烏梅二箇煎吞服立效

平胃散治脾血不固崩漏溫酒調下

方見大方料脾胃類

滋榮圓治勞傷過度致傷臟腑衝任氣虛不能約制或

暴下崩中或下鮮血或瘀血連日不止淋瀝不斷形羸氣劣倦怠困乏並皆治之

赤石脂

海螵蛸

去殼

側柏

去梗

各五兩

右為末醋糊圓梧桐子大每服三十圓飯飲送下空心日三服神效

加味四物湯治經斷後多年忽然再行遂成崩漏腹痛寒熱加人參茱萸生薑紅棗煎兼用熟附圓

四物湯方見前

熟附圓

大川芎

當歸

赤石脂

煨

白龍骨

木賊

去節

熟附子

各等分

右用醋米糊圓梧桐子大每服五十圓米飲吞下漸安

金華散治經血得熱崩漏不止口苦咽乾經候不通宜服

延胡索

瞿麥穗

川當歸

牡丹皮

乾葛

各一兩

石膏

一兩

蒲黃

半兩

桂心

葳靈仙 各三分

右為末每服二錢水一盞薑三片煎食前溫服日二三服

黃芩湯治崩中下血諸藥多用止血補血之劑此是陽乘陰前所云天暑地熱經水沸溢是也

右用黃芩不以多少為末燒秤錘淬酒調下又方

黃芩

黃蘗 各一錢

黃連 三錢
去毛

右用水四盞煎取一半去滓入炒阿膠末五錢滓再煎溫溫分三服空心腹痛加梔子三錢亦可

又方治積年血崩一服而愈

右以草血竭嫩者蒸油鹽姜淹喫小酒嚥下或收為末薑酒調服血竭草生於磚縫井頭少在地上

活血散治血崩不止用鹽梅七箇燒灰為末空心米飲服

又方陳槐花一兩百草霜半兩為末燒紅秤錘淬酒下

五倍子散治血崩帶下

大艾

一兩
醋炙

五倍子

二兩
炒赤

烏梅

半兩
去核

川芎

半兩

右為末每服二錢空心米飲下兩服止

奇效四物湯治有熱久患血崩一服稍安八服無恙

當歸

頭尾用

熟乾地黃

洗焙

白芍藥

大川芎

大艾葉

阿膠

蛤粉炒
如珠

黃芩

去爛者
各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎空心溫服

荳花散治白崩不止

白扁荳花焙乾為末

紫者不用
炒米

煮飲入燒鹽少許空心數服即效

又方用棕櫚絲爪燒灰等分為末鹽酒或鹽湯下

灸法治白崩小腹樸文當臍空直下百壯又灸內踝上
三寸左右各百壯名三陰

治漏下不止或赤或白灸交儀穴在內踝上五寸

帶下

白欬圓治衝任虛寒帶下純白

鹿茸

醋蒸培
二兩

白欬

金毛狗脊

燎去毛
各一兩

右為末艾煎醋汁打糯米糊圓梧桐子大每服五十圓空心溫酒下

當歸煎治赤帶不止腹內疼痛四肢煩疼不欲飲食日漸羸瘦

當歸

去蘆酒浸

赤芍藥

牡蠣

火煨取粉

熟地黄

酒蒸焙

阿膠

剉蚌粉炒

白芍藥

續斷

酒浸各一兩

地榆

半兩

右為末醋糊圓梧桐子大每服五十圓空心米飲送

下

卷栢圓治腹臟冷熱相攻心腹絞痛腰腿俱疼赤白帶下面色痿黃四肢羸乏

黃耆

去蘆蜜水炙

熟地黄

洗各半兩

卷栢

醋炙

赤石脂

煨醋淬

鹿茸

醋炙

白石脂

芎藭

代赭石

煨醋淬

艾葉

醋炒

桑寄生

鱉甲

醋炙

當歸

去蘆酒洗炒

地榆

各一兩

木香

不見火

龍骨

各半兩

乾薑

炮一分

右為末醋煮糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空心食前米飲送下

溫經散治衝任虛損月水過多崩漏帶下淋瀝不斷腰
腹重痛凡是五色帶疾並皆治之

禹餘糧

煨醋淬細研
水飛乾三兩

赤石脂

煨

龍骨

煨石
器研

白芍藥

川芎

附子

熟地黃

當歸

各一兩

乾薑

肉桂

各半兩

右為末每服二錢入麝香少許空心米飲調日二服
香附散治赤白帶下

百草霜

一兩

當歸

香附子

紫金皮

烏藥 八錢

伏龍肝 一兩

右為末以水牛膏同茴香炒舊酒調三大錢不拘時候通口服忌卵魚腥母猪等肉

白芷圓治婦人帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須以此排膿

白芷 一兩

單葉紅蜀葵根

二兩即爭荅古梅根無則以蘇木節代之

亦可

白芍藥

白礬

燒枯別研各半兩

右為末蠟圓如梧桐子大空腹米飲下十圓或十五圓候膿盡仍以他藥補之

白芍藥散治赤白帶下臍腹疼痛神效

白芍藥

一兩

乾薑

半兩

右為末微炒黃色每服二錢空心米飲下脫又服半月效

秋霜丹治赤白帶下

真秋石為末北棗去皮煑爛為圓梧桐子大每服五

十圓空心醋湯下

求嗣

溫經湯治衝任虛損月候不調或來多不斷或過期不來或崩中去血過多不止小腹有寒久不受胎曾經損娠瘀血停留小腹急痛發熱下痢手足煩熱唇口乾燥

吳茱萸

三兩湯洗
十次炒

半夏

二兩半
洗七次

桂心

去麋皮

人參

去蘆

白芍藥

牡丹皮

當歸

去蘆

阿膠

搗破蚱粉炒

川芎

甘草

炒各
二兩

麥門冬

去心
兩半

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎空心熱服經
事來多不斷以此吞服煖宮圓亦效

暖宮圓治婦人無子暖子宮冷服之神效

附子

炮去皮
臍一枚

杜仲

炒斷絲

地榆

桔梗

白薇

去土

川牛膝

去苗

川白芷

黃耆

沙參

厚朴

去麁皮薑汁
炒各四錢

北細辛

去葉

乾薑

蜀椒

各二錢
半

右為末煉蜜圓梧桐子大每服二十圓鹽酒下服之

一月自然有孕局方四物湯羊肉圓多服亦效

抑氣散治氣盛於血所以無子尋常頭暈膈滿體痛怔忡皆可服之香附子乃婦人之仙藥不可謂其耗氣而勿服

香附子

炒杵淨
四兩

茯神

去木
一兩

橘紅 二兩

甘草

炙
一兩

右為末每服二錢食前沸湯調服仍兼進紫石英圓

灸用

小溫經湯治經血不調血臍冷痛此方甚平易用藥且不多

當歸

去尾

附子

炮去皮臍

右為末每服三錢水一盞半煎空心溫服

秦桂圓治婦人無子經進有效

秦艽

桂心

杜仲

炒斷絲

防風

厚朴

各三分

附子

生

白茯苓

各一兩半

白薇

乾薑

沙參

牛膝

半夏

各半兩

人參一兩

細辛二兩一分

右並生礮為末煉蜜圓如赤豈大每服三十圓空心
食前醋湯或米飲下未效更加圓數次覺有孕便不
可服

陽起石圓治丈夫真精氣不濃不能施化是以無子

陽起石

大煨紅
研極細

鹿茸

燎去毛
酒炙焙

兔絲子

水淘淨酒浸
蒸焙別研

天雄

炮去皮

韭子炒

肉苁蓉

酒浸已上
各一兩

覆盆子

酒浸

石斛

去根

桑寄生

沉香

別研

原蠶蛾

酒炙

五味子

各半兩

右為末酒煮糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空心鹽湯或鹽酒下

濟陰丹治婦人久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脉虛損胞內宿挾疾病經水非時暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白濁心上疾訂皆令孕育不成以致絕嗣

方見前

灸法婦人絕子灸然容五十壯在內踝前直下一寸

又法絕嗣胞門閉塞灸關元穴三十壯通之
婦人妊子不成數墮腹痛漏下灸胞門五十壯在關
元左邊二寸是也右邊二寸名子戶

雜方

厚朴圓治婦人胃冷嘔吐不下食

厚朴

去麁皮切薑汁炒三兩

附子

去皮剉如莖三兩

右以生薑汁一升水五合煮令汁盡焙乾為末以酒
煮神麴為圓梧桐子大每服三十圓不拘時溫酒下

芎歸湯治頭暈痛諸脉平和惟肝脉獨弱可預見有崩
疾來及治血虛頭暈

方見前即佛手散

橄欖圓止渴潤咽乾

川百藥煎 烏梅

甘草

石膏

各等分

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓噉化

橘歸湯治肌膚手足俱有血線路此怒氣傷肝血失常
經以致如此服之神效

橘皮 二兩

當歸 一兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓溫酒下

八味圓治大小便秘澁此血弱不能榮養臟腑津液枯

澁數服即愈

方見大方科瘡渴類

鹿茸圓治虛弱服剛劑太過發搐此肝血不足為剛劑

所燥故令搐搦服此而愈

方見大方科瘡渴類

芍藥湯治冷證脇痛諸藥不效

香附子

四兩黃了醋二升
鹽一兩煮乾為度

肉桂

延胡索

白芍藥

右為末每服二錢沸湯調不拘時候服

健骨散治腰上實肉處痛不可忍

右以麝香末半錢用酒調服

補心湯治陰中生瘡名曰蠱瘡或痛或痒如蟲行狀淋瀝膿汁陰蝕幾盡治之當補心養胃

白茯苓

人參

前胡

半夏

湯洗七次去滑

川芎

各三分

橘皮

枳殼

麩炒去穰

紫蘇

桔梗

甘草

炙

乾薑

各半兩

當歸

一分兩

白芍藥 一兩
熟地黃 一兩半

右剉散每服四錢水盞半薑五片棗一枚同煎食前服

狼牙湯治陰中蝕瘡爛潰膿水淋漓臭穢

狼牙剉煎濃汁以綿纏筋頭大如蠶浸濃汁瀝陰中數次

雄黃允散治下部蟲瘡

雄黃 研

青箱子

苦參

黃連 各二分

桃仁

去皮尖
研一分

右為末以生艾搗汁和如棗核大綿裹內下部未效
更加扁竹汁無艾只用綿裹散子內下部亦可

洗搦湯療陰蝕

甘草

乾漆 各一兩

黃芩

乾地黄

當歸

芍藥 各

兩

龜甲 五兩

右藥用水七升煮取一半去滓以綿帛納湯中搦
瘡處良久即易日二度每搦湯可行十里許即拭

乾再取甘濕散薄傅瘡上使徧可經半日又以湯搗

搗訖如前敷藥

甘濕散用五月五日蝦蟆青木香石硫黃鋪精為末生麝香臨時加入

藿香養胃湯治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈

藿香

白朮

白茯苓

神麴

炒

烏藥

去木

縮砂仁

薏苡仁

半夏麴

人參

各半兩

華澄茄

甘草

炙各三錢半

右剉散每服四錢水盞半薑五片棗二枚同煎不以

時

妳癰瘡

黃瓜萋 一二箇連皮攘子剉碎

右用無灰常酒一二升於沙瓶內煮存一升去滓時
時溫服酒盡再煮滓服如覺初時便服此藥即時止
痛更不成瘡如已成瘡服之其瘡自穿而痛自止

又方尚未成瘡纔覺腫硬作痛以蔥白熨之其法用中
樣小海味瓶口寬者以炭火入瓶內上以熱灰填之
不封口用蔥葉及蔥白搥損令徧覆瓶口以手帕子

裏定倒執將瓶口向腫處任意輕輕熨之有驗

治茄子疾心燥連綿黃水易治白水難愈烏金二豆散

薑棗子煎溫服

方見前

又方生枳殼為散煮熏洗却用綃帛包枳殼滓納入陰中即日漸消

圓方茄皮白礬馬稻頭根朴硝澤蘭煮水熏洗加入炒茄灰少許

敷藥朴硝為末黃瓶柴燒瀝調敷或用濃鉄漿水敷

丁疽病心燥四肢痠癢輪冷痛或腹中絞刺小嘉禾
散猪肝蒜片煎服

方見前

又方硫黃一兩大鯉魚一箇去頭皮納入藥故紙裹黃
泥固濟火煨煙盡為末米糊圓梧桐子大每二十圓
溫酒下如下疽生蟲所下如柿汁臭穢心中疔痛悶
絕虛煩甚者不可治

磁石散治子宮不收名癰疾有痛不可忍者

磁石

酒浸火煨

右為末糯米糊圓梧子大每服二十圓空心滑石湯

下

鉄粉散治同前

當歸

磁石

半兩酒浸

鉄粉

右為末米飲調下隔夜用角藥次日服此

角藥用鉄粉螺青為

末磨刀水調

塗產門上

熏洗方荆芥穗藿香葉臭椿樹皮煎湯熏洗即入

三萸圓

食茱萸

吳茱萸

湯洗微炒

桔梗

水浸一伏時取出浸火焙

白茯苓

青皮

去白

山茱萸

去核取肉

舶上茴香

湯去砂炮各一兩

五味子

淨揀

海藻

大腹皮

酒浸過

川練子

去核

玄胡索

各一兩二錢半

右為末酒糊圓如梧桐子大每服三十五圓木通湯下下虛加川烏炮去皮肉桂去麁皮各一兩腰腹疼夏用桃仁去皮尖麁炒別研青皮去白枳實去穰各一兩為南木香七錢半

一捻金圓服前藥未效却用

玄胡索

舶上茴香

吳茱萸

炒

川練子

青木香

各二兩


右為末粳米糊圓如梧桐子大每服三十五圓空心
木通湯服又用梅花腦子半錢鐵孕粉一錢水調刷
上如陰畔生庖以涼血飲每服三錢加凌霄花少許
煎空心服

見前

四物湯治產育艱難或一歲一產可以此少間之每服

三錢加薑薑子一撮於經行後空心服又方用

對麻葛根湯二兩加瞿麥乾土牛膝枯薑根豆豉炒各
半兩為散分作八服空心一日二服



世醫得效方卷十五